

NEWS score	Overvåkningsfrekvens	Klinisk respons
0	<i>Minimum hver 12. time</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ta alltid kontakt med sykepleier/lege ved bekymring for pasienten</li> <li>Vurder behov for tiltak</li> </ul>
1-4	<i>Minimum hver 4.-6. time</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ansvarlig sykepleier vurderer behov for kliniske tiltak og legevurdering</li> </ul>
Totalt 3 i ett parameter	<i>Minimum 1 gang pr. time</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ansvarlig sykepleier skal kontakte lege for vurdering</li> </ul>
5-6	<i>Minimum 1 gang i timen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vurder sepsis ved 2 eller flere Q-sofa kriterier</li> <li>Ansvarlig sykepleier kontakter lege umiddelbart, evt. ring 113</li> <li>Lege vurderer behov for overflytting til høyere behandlingsnivå</li> <li>Vurder om det er forsvarlig å forlate pasienten</li> </ul>
7 eller høyere	<i>Kontinuerlig overvåkning av vitale funksjoner</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vurder sepsis ved 2 eller flere Q-sofa kriterier</li> <li>Ansvarlig sykepleier kontakter lege umiddelbart, evt. ring 113</li> <li>Ikke forlat pasienten før oppfølging og behandling er avklart med lege</li> </ul> <p><b>NB:</b> Sjekk behandlingsavklaring i pasientens journal</p>

- ✓ Vurder **alltid** vitale parametere mot normal NEWS og/eller forrige måling
- ✓ Vurder **alltid** tiltak opp mot behandlingsavklaring og kjennskap til den enkelte pasient. Overvåkningsfrekvens vurderes i hvert tilfelle
- ✓ **Q-sofa kriterier:** Systolisk blodtrykk  $\leq 100$ . Respirasjonsfrekvens  $\geq 22$ . Endret mental status